

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.

C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

BULLETIN N° 23 d'AOUT 1962

2 AOUT 1962

AVERTISSEMENTS

V I G N E

MILDIOU. - Afin d'éviter les contaminations tardives et de favoriser un meilleur aoûtement des bois, exécuter un dernier traitement dans le courant de la semaine du 6 au 11 août 1962.

VERS DE LA GRAPPE. -

COCHYLIS (2ème génération). - Dans tous les secteurs habituellement parasités et dans les lieux où la présence de chenilles de 1ère génération a été observée :

1°/ dans les crûs précoces effectuer un traitement :

- à réception à l'aide des produits du type "préventif"
- ou dans une semaine à l'aide des produits du type "curatif"

2°/ dans tous les autres crûs : Retarder le traitement indiqué ci-dessus de 7 à 8 jours.

Ce traitement, en pulvérisation ou en poudrage, sera effectué de préférence seul en visant tout particulièrement les grappes.

EUDEMIS (Région d'EPERNAY) - Il est encore trop tôt pour intervenir.

INFORMATIONS

OIDIUM. - Ajouter un produit mouillable à la bouillie anti-mildiou ou exécuter un poudrage.

ARAIGNEES ROUGES. - Intervenir en utilisant de préférence un acaricide spécifique de contact, qui peut être mélangé à la bouillie anti-mildiou. Prendre soin de faire une pulvérisation abondante.

ACARIOSE. - Le traitement recommandé pour lutter contre les araignées est valable; toutefois, il est à noter que le tétradifon, utilisé seul, semble insuffisant pour limiter les populations estivales de ces acariens d'une façon satisfaisante.

Dans les nombreux foyers d'acariose observés au printemps il sera nécessaire de renouveler cette application dans la première décade du mois de septembre.

P14.7

GRANDE CULTURE

AVERTISSEMENT

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE.-

Il n'y a pas à envisager une nouvelle protection des cultures contre cette maladie.

INFORMATIONS

PUCERON NOIR DE LA BETTERAVE.-

Des pullulations localisées de puceron noir se remarquent encore. La présence de nombreux prédateurs rend toute intervention inutile.

CHENILLES DEFEUILLANTES SUR BETTERAVE.-

Des chenilles de noctuelles et de phasiane endommagent, très localement, le feuillage des cultures. Il n'y a présentement plus lieu de craindre une extension de ces dégâts, les larves étant arrivé à leur complet développement.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytop sanitaire de REIMS.